str. M. Kogălniceanu, bl. I - parter, 705200 Pașcani, Iași
telefon: 0232.761733, fax: 0232.765698
email: secretariat@interdentis.ro
www.interdentis.ro

CE AVEȚI DE FĂCUT DUPĂ APLICAREA DINȚILOR PE IMPLANTURI DENTARE

Dinții pe implant sunt alcătuiți din 3 categorii de piese:

1. **IMPLANTUL** - a fost aplicat în os în timpul intervenției chirurgicale.
2. **BONTUL PROTETIC**
   - este o pisă care imită un dinte șlefuit;
   - se fixează pe implant cu ajutorul unui șurub;
   - acest șurub a fost strâns cu o anumită forță pentru a se produce o tensionare pe filet, dar orice lucru înșurubat se poate desface;
   - de la vibrații, de la variații termice cal - rece, de la contactul dintre dinți când închideți gura șurubul care fixează bontul pe implant se poate desface;
   - dacă se desface șurubul bontului protetic veți simți că dintele / dinții au un mic joc.
3. **COROANA DENTARĂ**
   - coroanele pe implanturi nu se cimentează cu un ciment definitiv la fel ca lucrările pe dinții naturali deoarece trebuie să putem îndepărta lucrarea atunci când este nevoie să verificăm implantul;
   - prin urmare este posibil ca dinții cimentați pe implanturi să se miște sau chiar să se desprindă;

Mobilizarea coroanelor pe implant nu înseamnă, de cele mai multe ori, că se mișcă implantul. Acesta odată integrat în os are o stabilitate foarte bună. Nu este o urgență imediată, dar este nevoie să vă programați la medicul dumneavoastră pentru reînșurubare sau recimentare.

FOARTE IMPORTANT!

Durata de utilizare a dinților construiți pe rădăcinile artificiale pe care le aveți acum depinde de cât de mult timp veți păstra sănătos osul din jurul implanturilor. Acest os, odată cu trecerea timpului, scade, în mod normal, însă rata de resorbție este mică.

Dacă în jurul dinților gingia este inflamată cronic (pe termen lung), această inflamație se transmite osului de dedesubt, acesta se resoarbe foarte repede, în jurul implantului apar niște pungi adânci imposibil de curățat și puteți pierde implanturile într-o perioadă foarte scurtă.

PRIN URMARE

Igiena orală este extrem de importantă, controalele periodice sunt obligatorii. Gingia sănătoasă este de culoare roz, nu este umflată sau roșie și nu sângerează.

str. M. Kogălniceanu, bl. I - parter, 705200 Pașcani, Iași
telefon: 0232.761733, fax: 0232.765698
email: secretariat@interdentis.ro
www.interdentis.ro

PERIAJUL DENTAR

- trebuie făcut dimineața și seara;
- trebuie să dureze 4 - 5 minute;
- se evită mișcările orizontale și presiunea excesivă;
- se preferă mișcările de ușoară vibrație înainte - înapoi urmate de mișcări de coborâre (la maxilar) și ridicare (la mandibulă), mișcările circulare și verticale.

SCOPUL PERIAJULUI DENTAR este de a îndepărta mecanic cu periuța (medie sau moale ca duritate) toate depunerile de microbi de pe dinți.

Aproape toate pastele de dinți conțin mentol, prin urmare senzația de gură curată provocată de prezența pastei de dinți în cavitatea orală nu este totuna cu lipsa depunerilor de microbi pe dinți sau pe gingii.

DACĂ - într-o anumită zonă a gurii gingia sângerează (la periaj, la masticație sau, cel mai grav, spontan) este un semn clar că acolo bacteriile au stat pe dinții și pe gingii mult mai mult decât este necesar. Acea zonă trebuie igienizată cu mai multă atenție (nu apăsam mai tare ci periem mai mult timp, cu mai multă grijă), chiar dacă în primele zile sângerarea la periaj va fi mai mare din cauza inflamației.

Cu o igienă orală riguroasă orice sângerare gingivală trebuie să dispară după maxim 7 - 10 zile. Orice sângerare gingivală care persistă peste acest interval și care nu poate fi controlată prin igienă orală personală este o urgență și trebuie să vă programați imediat la cel mai apropiat cabinet stomatologic pentru o igienizare profesională.

DACĂ - aveți obiceiuri greșite de tipul bruxismului (scrâșnitul din dinți) sau contracturilor izometrice ale mușchilor maseteri (încleștarea maxilarelor) este nevoie să purtați o gutieră de silicon (obligatoriu noaptea și cât mai mult ziua) pentru a proteja, lucrările, dinții și osul maxilarelor.